

## II, Definiciones operativas de casos de infección por SARS CoV-2 /COVID 19

### 1. ¿Cómo se define un caso sospechoso de infección SARS CoV-2 /COVID 19?

Se recomienda diferenciar entre población sintomática y asintomática



### ¿Cómo se manifiesta?


Síntomas respiratorios agudos (2 o más de los siguientes: fiebre, tos, dificultad respiratoria, odinofagia, fatiga, adinamia), o síntomas gastrointestinales (diarrea, emesis, dolor abdominal).



La probabilidad es mayor en caso de: Empeoramiento de la sintomatología respiratoria o su persistencia al día 8 desde su aparición.



Imágenes pulmonares con vidrio esmerilado periférico o consolidaciones bilaterales.



También debe sospecharse en toda persona asintomática que ha tenido "contacto estrecho" con un caso confirmado de covid-19 en los últimos 14 días.



### ¿Y cómo lo confirmo?

El caso se confirma en las personas definidas como sospechosas con un resultado positivo en alguna de las pruebas definitorias de SARS-CoV-2/COVID-19 son la RT PCR y la prueba de antígenos.

Tabla 1. Definición de contacto estrecho

El contacto estrecho de un caso probable o confirmado de SARS-CoV-2/COVID-19 se define como:

- La persona que se encuentra a menos de 2 metros de un caso confirmado de SARS-CoV-2/COVID-19. Este contacto puede ocurrir mientras cuida, viva viste, comparta un área de espera, se encuentra en el lugar de trabajo o en reuniones con un caso de SARS-CoV-2/COVID-19.
  - o
- Una persona que tenga contacto directo, sin protección, con secreciones infecciosas de un caso de SARS-CoV-2/COVID-19 (por ejemplo, con la tos o la manipulación de los pañuelos utilizados).
  - o
- Un trabajador del ámbito hospitalario que tenga contacto con caso probable o confirmado o con secreciones infecciosas de un caso de SARS-CoV-2/COVID-19, sin EPP.
  - o
- Una persona que viaje en cualquier tipo de transporte y se sienta a distancia de dos asientos o menos, en cualquier dirección, del caso de SARS-CoV-2/COVID-19. Los contactos incluyen compañeros de viaje y personal de la tripulación que brinde atención al caso durante el viaje.

Fuente: Instituto Nacional de Salud