

2

Vacunación del escolar y adolescente sano: PAI Colombia

Vacuna	6 años	9 años	10 años	11 años	15 años	18 años
VPH ^a (Virus del Papiloma Humano)		X				
Td niñas (Tétanos, difteria)			X			
SARS-CoV-2 ^b						

2.1

Vacunación del escolar y adolescente sano: esquema sugerido por la SCP

Vacuna	6 años	9 años	10 años	11 años	12- 15 años	16 años
Influenza (Tetravalente o trivalente) ^c						
Tdap ^d				X		
VPH ^a		X				
SARS-CoV-2 ^b						
Meningococo Conjugada Tetravalente (MenACYW) ^e				X		X
Hepatitis A						
Hepatitis B						
Varicela						
SRP						
Meningococo B Bexsero ^g			X ^f			
Dengue ^g TAK-003	X					

Incluida en el PAI

Vacuna complementaria, no incluida en el PAI

Si no tiene esquema infantil completo
(ver anexo para definir número de dosis).

Cuando se encuentre disponible

a. A partir del 1 de octubre de 2023, se anunció la dosis única de VPH género neutro (niños y niñas).

b. La dosificación varía según la vacuna disponible; la edad recomendada de inicio de vacunación es desde los 6 meses con vacunas de ARNm. Se recomiendan refuerzos con vacunas actualizadas según epidemiología.

c. Se recomienda vacunación anual durante todo el curso de la vida.

d. Niños y niñas.

e. Se puede utilizar cualquiera de las tres vacunas. La dosificación varía si ya se había recibido vacuna previamente. Ver anexo.

f. Ver anexo para indicación de refuerzos.

g. La vacuna es recomendada a partir de los 4 años en un esquema de dos dosis, con un intervalo de tres meses.