

Vacunación para mayores de 18 años

Ver tablas adicionales para consideraciones específicas de vacunación, según el riesgo individual.

Vacuna	Rango de edad			
	18-26 años	27-49 años	50-59 años	≥60 años
Fiebre amarilla	1 dosis			Contraindicada
Hepatitis A	1 dosis (2 dosis según riesgo)			
Hepatitis B	3 dosis (4 dosis según riesgo)			
Influenza inactivada o recombinante	1 dosis anual			
Meningococo A, C, W, Y	1 o 2 dosis según factores de riesgo			
Meningococo B	2 dosis, dependiendo de la indicación			
Neumococo (PCV13, PCV15, PCV20)	1 dosis ^a			Aplican las mismas consideraciones de dosificación que para individuos entre 19 y 59 años, pero para > 65 años de edad se recomienda que todas las personas estén vacunadas
Neumococo (PPSV23)	Se sugiere para Colombia 1 dosis de PCV13 seguida de PPSV23, con refuerzo de PPSV23 cinco años después			
Sarampión, paperas, rubéola SRP	1 dosis en la edad adulta según vacunación previa y riesgo			No recomendada después de los 65 años
SARS-CoV-2	Esquema primario + refuerzo con vacunas actualizadas ARNm			
Tétanos, difteria, tos ferina (Tdap o Td)	1 dosis de Tdap, luego Td o refuerzo de Tdap cada 10 años. Según riesgo y vacunas previas: 1 dosis de Tdap cada embarazo; 1 dosis de Td/Tdap para el tratamiento de heridas; 1 dosis de Tdap para la "Estrategia Capullo" ^b			
Varicela	2 dosis (si nació en 1980 o después)		Vacunar para zóster. Se considera inmunizado para varicela si nació antes de 1980	
Virus del papiloma humano	2 dosis hombres y mujeres Si está inmunocomprometido 3 dosis	Mujeres entre 27 a 45 años según decisión concertada con el paciente según riesgo	No aprobada	
Dengue ^c	2 dosis			No aprobada
Viruela del mono	Según riesgo : 2 dosis separadas 28 días			
Virus respiratorio sincitial	En embarazo		No hay recomendación	
Zóster recombinante	2 dosis para pacientes con inmunosupresión		2 dosis en todos los mayores de 50 años	

Vacuna recomendada para adultos en este rango de edad

Vacunación recomendada para adultos con un factor de riesgo adicional u otra indicación.

Vacunación recomendada cuando esté disponible en el país, para adultos que cumplen con los requisitos de edad, carecen de documentación de vacunación o carecen de evidencia de inmunidad

Vacunación recomendada cuando esté disponible en el país para adultos con un factor de riesgo adicional u otra indicación.

Vacuna contraindicada en el rango de edad

Sin recomendación/ No aplicable

a. Las vacunas conjugadas deben separarse de las no conjugadas (PPSV23), mínimo 8 semanas en pacientes con fístula de líquido cefalorraquídeo, implante coclear e inmunosuprimidos. En el resto de los individuos deben separarse 1 año.

b. Según el riesgo, se puede recomendar 1 dosis Td/Tdap para el tratamiento de heridas o 1 dosis de Tdap para 'Estrategia capullo'.

c. La vacuna es recomendada entre los 4 y 60 años, en un esquema de dos dosis, con un intervalo de tres meses.